

A photograph of four yellow mushrooms with slightly flattened caps and short, thick stems, growing on a forest floor covered with dry leaves and green grass. The mushrooms are arranged in a row, with the one on the far right being the largest and most prominent. The text is overlaid on the upper half of the image.

ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИВИДОВОЙ СИСТЕМАТИКИ
АГАРИКОМИЦЕТОВ (AGARICOMYCETES)

Иванов А. И.

В связи с тем, что агарикомицетам свойственно половое размножение важным источником новых комбинаций генов, определяющих различные признаки, является половая рекомбинация, проявляющаяся при скрещивании между формами и разновидностями одного вида. Кроме того, в связи с простой организацией геномов грибов вполне вероятным оказывается существование большого количества межвидовых гибридов особенно в богатых видами активно эволюционирующих группах

Lactarius semisanguifluus



Lactarius deterrimus



Lactarius deliciosus



Boletus edulis f. *praecox*



B. pinophilus



B. edulis f. *edulis*.



Leccinum brunneogriseolum



L. variicolor



L. holopus



Lactarius pubescens



Agaricus bisporus



Leccinum versipelle var. *versipelle*, *L. versipelle* var. *flavescens* и *L. percandidum*



B. reticulatus



Leccinum albstipitatum



L. aurantiacum



Таким образом, понятие формы и разновидности в каждом конкретном случае следует разграничивать и при необходимости делать соответствующие номенклатурные комбинации. Это позволит избежать путаницы при объединении видов, тенденция к которому наметилась в связи с широким использованием молекулярно-генетических методов исследований

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

