Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Биологический факультет
Кафедра микологии и альгологии

Биологические особенности и генотипическое разнообразие *Rhizoctonia solani* J.G. Kühn

Выпускная квалификационная работа
студентки 2 курса магистратуры
Ярмеевой Марии Маратовны

Научные руководители
д.б.н., в.н.с. Еланский Сергей Николаевич
к.б.н., н.с. Кокаева Людмила Юрьевна

Введение

Черная парша
на клубне

Чистая культура
R. solani

Жизненный цикл *R. solani* (по Wharton et al., 2007)

Цели и задачи

Цель работы – изучение биологических особенностей и генотипического разнообразия возбудителя ризоктониоза картофеля.

Задачи:

- выделение изолятов *R. solani* с клубней картофеля и пополнение имеющейся коллекции;
- проверка штаммов коллекции на чувствительность к применяемым против возбудителя ризоктониоза картофеля фунгицидным препаратам;
- оценка вирулентности штаммов к растениям-хозяевам;
- сравнение штаммов по последовательностям участка ITS1-5,8S-ITS2 и гена *tef-1 α* ;
- поиск генетических факторов устойчивости к пенцикуруну.

Места сбора образцов

Регион сбора*	Годы сбора	Количество изолятов	Регион сбора*	Годы сбора	Количество изолятов
Москва и Московская обл. (12)	2012-2019	40	Калужская обл. (1)	2018	4
Смоленская обл. (1)	2012	20	Респ. Марий-Эл (1)	2018	1
Владимирская обл. (1)	2014	6	Якутия (1)	2018	1
Костромская обл. (2)	2014, 2017-2018	16	Приморский край (1)	2018	1
Магаданская обл. (1)	2017	2	Тамбовская обл. (1)	2019	1
Германия (2)	2013	7	*в скобках указано количество точек сбора в регионе		
Всего		99			

Определение устойчивости к фунгицидам

Исследованы
пенцикурон (препарат Престиж)
флудиоксонил (препарат Максим)
Оба препарата разрешены для
обработки клубней картофеля
перед посадкой

Определение патогенности

Заражение ломтиков картофеля

Анализ участков генома

Использованные в работе праймеры

Ген	Название праймера	Последовательность нуклеотидов праймера	Температура отжига	Ссылка
1	ITS1	TCCGTAGGTGAACCTGCGG	55°C	White et al., 1990
	ITS4	TCCTCCGCTTATTGATATGC		
2	TEF1-983F	GCYCCYGGHCAYCGTGAYTTYAT	60°C	Rehner, Buckley, 2005
	TEF1-2218R	ATGACACCRACRGCACRGTGTG		
3	B36F	CACCCACTCCCTCGGT	58°C	Thon, Royse, 1999, модиф.
	B42R	CTGGTACTGCTGGTACTC		

Проанализированы участки ДНК 1) ITS региона, 2) гена *tef-1 α* и 3) β -тубулина

Чувствительность к флудиоксонилу

ЕС50 (эффективная концентрация), мг/л

Ср. 1,264

Мин. 0,006

Макс. 41,687

Концентрация, мг/л

Чувствительность к пенцикурону

ЕС50 (эффективная концентрация), мг/л

Ср. 0,271

Мин. 0,003

Макс. >500

Концентрация, мг/л

Заражение ломтиков картофеля

3 сут роста

3 нед роста

Штаммы после заражения,
на питательной среде

Идентификация

Штаммы AG-3 и AG-5, устойчивые к пенцикурону, образовывали характерные симптомы на клубнях.

Филогенетический анализ

Филогенетическое дерево
R. solani, построенное по
гену *tef-1α*

Филогенетический анализ

Филогенетическое дерево
R. solani, построенное по двум
участкам (ITS, гену *tef-1α*)

Не было выявлено группировки
штаммов по регионам происхождения
и сортам картофеля.

Кроме того, выделенный с листа томата
штамм не имеет существенных отличий
от штаммов, выделенных с клубней
картофеля.

Все последовательности депонированы в Genbank.

Изучение структуры гена β -тубулина

- 1) Нуклеотидная последовательность
- 2) Аминокислотная последовательность.

Выделены кодоны, содержащие значимые мутации

1)		750		890		900		910			
Consensus		5TCA	ATGTC	TGGT	ATCACC	TTCTT	CATG	GTCGG	CTTTG	CGCC	TTTGA
Identity		[Red box around ATCACC]				[Red box around CATG]					
1. 3A-R12S2PT7		5TCA	ATGTC	TGGT	ATCACC	TTCTT	CATG	GTCGG	CTTTG	CGCC	TTTGA
2. 5A-R13M2PT1		5TCA	ATGTC	TGGT	ATCACC	TTCTT	CATG	GTCGG	CTTTG	CGCC	TTTGA
3. R-C sens		5TCA	ATGTC	TGGT	GTCACC	TTCTT	CATT	GTCGG	CTTTG	CGCC	CTTGA
4. Rh-131 resist		5TCA	ATGTC	TGGT	ATTACC	TTCTT	CATG	GTCGG	CTTTG	CGCC	TTTGA

2)		90		100		110		120		130		
Identity		[Green bar]										
1. AFE84657.1		DLNHLV	SIVMSG	MTTCL	RFPGQL	NSDLR	KLAVNM	VFPF	PRLHFF	IVGF	FAP	
2. R-C (sens)		DLNHLV	SIVMSG	MTTCL	RFPGQL	NSDLR	KLAVNM	VFPF	PRLHFF	IVGF	FAP	
3. Rh-131 (resist)		DLNHLV	SIVMSG	ITTCL	RFPGQL	NSDLR	KLAVNM	VFPF	PRLHFF	FMVG	FAP	
4. R12S2PT7 (AG-5)		DLNHLV	SIVMSG	ITTCL	RFPGQL	NSDLR	KLAVNM	VFPF	PRLHFF	FMVG	FAP	
5. R13M2PT1 (AG-5)		DLNHLV	SIVMSG	ITTCL	RFPGQL	NSDLR	KLAVNM	VFPF	PRLHFF	FMVG	FAP	

3A-R12S2PT7 и **5A-R13M2PT1** – обнаруженные нами устойчивые к пенцикуруну штаммы AG-5;

Rh-131 – устойчивый, **R-C** – чувствительный к пенцикуруну штаммы японских исследователей AG-4 (Roh et al., 1999);

AFE84657 – штамм AG-1-IA из Китая (GenBank)

Изучение структуры гена β -тубулина

Компьютерное моделирование пространственной структуры β цепи тубулина с использованием пакета Swiss-Model

Выводы

1. Обнаружено два устойчивых к пенцикурону штамма пятой и один третьей анастомозной группы.
2. Штаммы способны расти на живой ткани клубней картофеля.
3. Выявлена генетическая неоднородность участка ITS1-5,8S-ITS2 и гена *tef-1 α* внутри третьей анастомозной группы.
4. Обнаружены однонуклеотидные замены в последовательностях β -тубулина устойчивых к пенцикурону штаммов пятой анастомозной группы.

The background of the image is a microscopic view of plant tissue, likely an epidermis, showing a network of cells with distinct cell walls. The cells are arranged in a somewhat regular pattern, with some showing small, dark, oval structures that could be stomata or other specialized cells. The overall color is a light, pale blue, suggesting a specific staining or lighting condition used for microscopy.

Спасибо за внимание!